

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА**  
**НЕОИНТЕСТОПАН**  
**(NEOINTESTOPAN)**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название.**

Неоинтестопан

**Международное непатентованное наименование:**

Аттапулгит

**Химическое название:** магнезия алюмосиликат гидрат коллоидный

**Лекарственная форма.**

Таблетки, покрытые оболочкой.

**Состав.**

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит в качестве активного *вещества* 630 мг аттапулгита.

*Вспомогательные вещества:* пектин, повидон, сахароза, консервант Е 127, красители Е 171 и Е172.

**Описание.**

Округлые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, розоватого с серовато-коричневым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Противодиарейное средство.

**Код АТХ:** А07ВС04

**Фармакологические свойства.**

Противодиарейное средство, адсорбент, природная очищенная смесь из группы палигорскитных минералов. Связывает патогенные возбудители и адсорбирует образуемые ими токсины, что приводит к уменьшению интоксикации и нормализации кишечной флоры. Способствуя сгущению жидкого содержимого кишечника, улучшает консистенцию стула и уменьшает количество актов дефекаций.

За счет выраженного вяжущего эффекта оказывает положительное воздействие на раздраженную слизистую кишечника; уменьшает спазмы кишечника.

Нетоксичен, не задерживает рентгеновские лучи и не изменяет цвет кала.

**Фармакокинетика.**

После приема внутрь не всасывается, постепенно продвигается к дистальному концу пищеварительного канала и выводится в неизменном виде.

**Показания к применению.**

Острая диарея: инфекционного, аллергического и лекарственного генеза, пищевая токсикоинфекция, нарушение равновесия кишечной микрофлоры, раздражение слизистой оболочки кишечника (в составе комбинированной терапии).

**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к аттапулгиту, кишечная непроходимость, лихорадка, детский возраст (до 3-х лет), хроническая диарея, диарея паразитарного генеза.

**Применение в период беременности и лактации.** Опыт применения препарата при беременности и в период лактации ограничен (негативные эффекты маловероятны, т.к. препарат не всасывается из ЖКТ).

**Способ применения и дозы.**

Внутрь. Таблетки следует проглатывать не разжевывая, запивая жидкостью.

Первую дозу принимают при появлении первых признаков диареи.

Взрослые: начальная доза – 4 таблетки, затем по 2 таблетки после каждого акта дефекации.

Не следует превышать максимальной суточной дозы, равной 14 таблеткам.

Дети от 6 до 12 лет: Начальная доза – 2 таблетки, после каждой дефекации еще по 1 таблетке, максимальная суточная доза - 7 таблеток. Лечение детей младше 6 лет проводят только по назначению врача и под его наблюдением.

Длительность лечения Неоинтестопаном не должна превышать 2 дней.

**Побочное действие.**

Запор (редко). Аллергические реакции.

**Передозировка.**

Случаев передозировки Неоинтестопана до настоящего времени не описано.

Если это произойдет, прием препарата следует немедленно прекратить и провести промывание желудка.

**Взаимодействия с другими лекарственными средствами.**

Уменьшает абсорбцию лекарственных средств из ЖКТ, поэтому препарат не следует применять одновременно с другими лекарственными средствами,

**Особые указания.**

Если при диарее и связанной с ней потерей жидкости необходима пероральная регидратация, ее следует проводить в первую очередь, независимо от лечения аттапулгитом.

Не следует применять таблетки с поврежденной оболочкой.

При лечении больных сахарным диабетом следует иметь в виду, что Неоинтестопан содержит сахарозу.

Интервал времени между приемом Неоинтестопана и других лекарственных препаратов должен составлять не менее 2 часов.

При повышении температуры тела, кровянистом стуле или в тех случаях, когда после приема препарата в течение 2 дней диарея продолжается, диагноз нужно уточнить с помощью клинических и бактериологических исследований.

**Форма выпуска.**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 630 мг. По 10 таблеток в контурно-безъячейковой упаковке из алюминиевой фольги. 2 контурно-безъячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению вложены в картонную пачку.

**Условия хранения.**

При комнатной температуре, в герметичной упаковке, в недоступном для детей месте.

**Срок годности.**

4 года. Не использовать после срока, обозначенного <EXP> на упаковке.

**Условия отпуска из аптек.**

Без рецепта.

**Название и адрес фирмы-производителя.**

Сандоз Прайвит Лимитед (Индия) (Sandoz Private Limited, India/ Annie Basent Road, Worli, 400 018 Mumbai, India).

**Эксклюзивный дистрибьютор:**

ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл», Россия

119590, Москва, ул. Улофа Пальме, 1

Тел.: 775-39-38, Факс: 514-10-54/67